

# HEMOENTEROL P-44 — PREMEZCLA MEDICAMENTOSA

REG. SAGARPA: Q-0029-039

*La mejor forma de  
marcar la diferencia*

## SINÉRGICOS: ¿POR QUÉ?

Mecanismo de acción similar y no competitivo

Atacan el ribosoma bacteriano en diferentes sitios

Espectro de actividad complementario vía oral

MICROORGANISMOS	LINCOMICINA	ESPECTINOMICINA	HEMOENTEROL P-44
Brachyspira hyodysenteriae	✓	✗	✓
Lawsonia intracellularis	✓	✗	✓
Clostridium spp.	✓	✗	✓
<i>Escherichia coli</i>	✗	✓	✓
<i>Salmonella spp.</i>	✗	✓	✓
Campylobacter spp.	✗	✓	✓
Mycoplasma hyopneumoniae	✓	✗	✓


## FARMACOCINÉTICA COMPLEMENTARIA

### LINCOMICINA:

- Absorción oral alta (50%) y en forma activa (90%)
- Acumulación en tejidos y secreciones:
  - Pulmonar
  - Digestivo
- Reabsorción entero-hepática

### ESPECTINOMICINA:

- Antibiótico de barrido intestinal



LABORATORIOS OVEJERO DE MEXICO, S.A. DE C.V.  
19 SUR NO.4524 COL. REFORMA AGUA AZUL  
C.P. 72430 PUEBLA, PUEBLA, MEXICO  
TEL: (+52) (222) 2 31 3935  
marketing@labovejero.es · www.labovejero.mx

# ORIENTACIÓN TERAPÉUTICA

## C.D.P.- DIARREAS MIXTAS

- Amplio espectro de actividad
- Alta acumulación en **digestivo**
- Reabsorción entero-hepática

## NEUMONÍA ENZOÓTICA

- Eficacia probada en *M. Hyopneumoniae*
- Alta acumulación en **pulmón y secreciones**
- Reabsorción entero-hepática


ANTIBIÓTICOS  
·  
SINÉRGICOS  
·  
FARMACOCINÉTICA  
·  
COMPLEMENTARIA

## DOSIFICACIÓN

- 88 mg de actividad antibiótica durante 21 días por Kg. Pienso (equivalente a 2 kg. de HEMOENTEROL P-44 por Ton. Pienso)

## CUÁNDO

	Transición	Cebo
	<i>M. hyopneumoniae</i>	Disentería
<b>Metafláctico</b>	<i>E. Coli</i> Gram +	Salmonelosis Colitis e Ileítis
<b>Estratégico</b>	2 semanas antes de la fecha prevista de aparición de problemas y 1 semana después	



### HEMOENTEROL P-44 PREMEZCLA MEDICAMENTOSA

**Contenido neto:** 25 Kg

**Fórmula:** Cada g contiene:  
Lincomicina (hidrocloruro).... 22mg  
Espectinomina (sulfato)....22 mg  
Excipiente:  
Cascara de almendra/avellana  
c.b.p. ....1 g

**Especies de destino:** Porcinos.

**Indicaciones:** HEMOENTEROL PREMEZCLA MEDICAMENTOSA esta indicada para la prevención y tratamiento de la disentería porcina causada por *Brachyspira hyodysenteriae*, control de la Neumonía Enzoótica causada por *Mycoplasma hyopneumoniae*, tratamiento de la Colibacilosis causada por la *Escherichia coli* y tratamiento y control de la Enteropatía Proliferativa Crónica (ileítis) asociada a *Lawsonia intracellularis*.

**Tiempo de retiro:** No administrar a cerdas en gestación ni en lactación. Carne: 2 días.

**Dosis:** 2 mg de espectinomina + 2 mg de lincomicina/kg p.v./día (equivalente a 91 mg de premezcla medicamentosa/kg p.v./día) durante 21 días consecutivos. Determinar el peso del animal con la mayor exactitud para evitar una dosificación insuficiente. El pienso del medicado debe ser la única fuente de alimentación durante el tratamiento. El tiempo de mezclado del medicamento con el pienso es de 30 minutos.

Prevención y tratamiento de la disentería porcina, control de neumonía enzoótica y tratamiento de la colibacilosis: 22-44 mg de espectinomina + 22 - 44 mg de lincomicina/kg de pienso (equivalente a 1-2 kg HEMOENTEROL PREMEZCLA MEDICAMENTOSA/Ton de pienso) durante 21 días.  
Tratamiento y control de la enteropatía proliferativa crónica (ileítis) asociada a *Lawsonia intracellularis*: 44 mg de espectinomina + 44 mg de lincomicina/kg de pienso (equivalente a 2 kg HEMOENTEROL PREMEZCLA MEDICAMENTOSA/Ton de pienso) durante 21 días.


**Vía de administración:** Oral.

#### Advertencias:

- No usar en animales con hipersensibilidad conocida a la lincomicina, espectinomina y/o algún excipiente, ni con disfunción renal o hepática.
- No administrar a caballos la lincomicina produce colitis hemorrágica y diarrea con resultados graves.
- No permitir a conejos o a roedores (chinchillas, hamsters, cobayos), caballos o rumiantes, el acceso al agua o piensos que contengan lincomicina. La ingestión por estas especies puede resultar en efectos gastrointestinales graves.
- No usar en casos de infecciones nicóticas sistémicas.
- No usar en equinos destinados al consumo humano.

#### USO VETERINARIO

SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA  
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO



LABORATORIOS OVEJERO DE MEXICO, S.A. DE C.V.  
19 SUR NO.4524 COL. REFORMA AGUA AZUL  
C.P. 72430 PUEBLA, PUEBLA, MEXICO  
TEL: (+52) (222) 2 31 3935  
marketing@labovejero.es · www.labovejero.mx